

# i dermatoglifi palmari

tipologia

Il palmo della mano viene generalmente suddiviso in tre zone:

**Y zona interdigitale:** situata alla base delle dita (pollice escluso)

**Y zona tenere:** situata alla base del pollice

**Y zona ipotenare:** situata in posizione speculare alla zona tenere.


Al fine del calcolo della formula palmare vengono considerati i triradii indicati con le lettere a, b, c, d, t. Da ogni triradio parte una linea principale indicata rispettivamente come A, B, C e D che termina in una zona del palmo identificata tramite un numero compreso da 1 a 13.

Un altro metodo di misurazione è la conta delle creste comprese tra il triradio a ed il triradio b.

# i dermatoglifi palmari

tipologia

Nel disegno vengono riportati i principali punti di riferimento sul palmo della mano.




Tratto da 'Appunti sui dermatoglifi e sulla dattiloscopia' 7<sup>a</sup> edizione

# i dermatoglifi palmari

tipologia

Nel disegno vengono riportati i punti per il calcolo delle frequenze dei tipi-base di linee principali A, B, C e D nonché del main line index (MLI).




Tratto da 'Appunti sui  
dermatoglifi e sulla  
dattiloscopia' 7<sup>a</sup> edizione

# i dermatoglifi plantari

tipologia

Nel disegno vengono riportati i principali punti di riferimento sulla pianta del piede.



Tratto da 'Appunti sui dermatoglifi e sulla dattiloscopia' 7<sup>a</sup> edizione